



หยุดยุงลาย

ยุงลายกับโรคไข้เลือดออก

ไข้เลือดออก เป็นโรคที่มียุงลายเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกเป็นได้กังเด็ก
และพื้นที่หลายมักพบบ่อยในเด็ก โดยเฉพาะช่วงอายุ 5 - 14 ปี

1. ไข้สูงloy



- มีไข้สูง 39 - 40 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 2 - 5 วัน
- หน้าแดง
- มักจะไม่อิ่ว ไม่มีน้ำมูก
- ปวดเมื่อยตามตัว และปวดศีรษะ

2. อาการเลือดออก



4. กาวะซี็อก

เกิดจากความผิดปกติของระบบไหลเวียนเลือด

- มักจะเกิดช่วงไข้จะลด
- ผู้ป่วยมีอาการกระสับกระส่าย ซึ่ง
- มือเท้าเย็น ชีพจรเบา เร็ว
- มีอาการปวดท้องมาก
- อาเจียนหรือถ่ายเป็นเลือด
- ความดันต่ำ



รู้ก่อน รู้กัน รักษาได้ไข้เลือดออก

1. เช็ดตัวช่วยลดไข้
เป็นระยะๆ



2. ให้ยาลดไข้พาราเซตามอล
(ไม่ควรใช้ยาแอสไพริน หรือไอบูฟอร์เพฟน
เนื่องจากจะทำให้เกล็ดเลือดผิดปกติ
และระคายกระเพราอาหาร)



3. ดื่มน้ำผลไม้หรือ
น้ำเกลือแร่บ่อยๆ เนื่องจาก
ผู้ป่วยไข้เลือดออกมักมีภาวะขาดน้ำ



4. หากผู้ป่วยมีอาการมีอาการเหล่านี้
ในช่วงไข้ลดต้องรีบนำส่ง
โรงพยาบาลทันที ปวดท้อง,
ปัสสาวะน้อยลง, กระสับกระส่าย,
มือเท้าเย็น, ชีพจรเบา - เร็ว, ความดันต่ำ



ภายใน 24 - 48
ชั่วโมง หากผู้ป่วย
มีอาการไข้ลดลง
แล้วเริ่มกินอะไรได้
รู้สึกตัวดี ไม่ซึม แสดงว่า
อาการพ้นขีดอันตราย

